

# Sensorveiledning til ordinær eksamen Vår 2020.

## Generell sensurveiledning:

- Følgefeil skal normalt ikke straffes, men trekk inntil 20% om kandidaten burde forstå at dette var feil uten å kommentere dette.
- Pluss-minus-feil trekkes normalt ikke. Unntak er om kandidaten burde forstå at noe har gått galt, eller at det er spesifikt kommentert i sensurveiledningene.

## Oppgave 1

- a) Først skriver vi alle røtter om til potenser og løser opp parentesene

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{5}(\sqrt[5]{a^2})^2 a^{\frac{1}{5}}}{a^{-1}(\sqrt{5}a^{\frac{1}{3}})^3} &= \frac{\frac{1}{2} \left(a^{\frac{2}{5}}\right)^2 a^{\frac{1}{5}}}{a^{-1} \left(5^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{3}}\right)^3} \\ &= \frac{\frac{1}{2} a^{\frac{2}{5} \cdot 2} a^{\frac{1}{5}}}{a^{-1} 5^{\frac{1}{2} \cdot 3} a^{\frac{1}{3} \cdot 3}},\end{aligned}$$

deretter bruker vi regnereglene for å gange sammen

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{2} a^{\frac{2}{5} \cdot 2} a^{\frac{1}{5}}}{a^{-1} 5^{\frac{1}{2} \cdot 3} a^{\frac{1}{3} \cdot 3}} &= \frac{\frac{1}{2} a^{\frac{4}{5} + \frac{1}{5}}}{5^{\frac{3}{2}} a^{-1+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} a^{\frac{4}{5} + \frac{1}{5} - 0}}{5^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{a}{5}.\end{aligned}$$

**Sensurveiledning:** Halv score for å gjøre uttrykket om til potenser. Halv score for å legge sammen eksponentene. Trekk 10% for hver feil (inntil 50 prosentpoeng for hver del).

b) Husk at  $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$ . Dermed

$$\frac{5t^2 - 45}{t - 3} : \frac{t + 2}{3t^2 + 6t} = \frac{5t^2 - 45}{t - 3} \cdot \frac{3t^2 + 6t}{t + 2}.$$

Vi faktoriserer ved å ta felles faktorer ut, og bruke konjugatsetninga

$$\begin{aligned}\frac{5t^2 - 45}{t - 3} \cdot \frac{3t^2 + 6t}{t + 2} &= \frac{5(t^2 - 9)}{t - 3} \cdot \frac{3t(t + 2)}{t + 2} \\ &= \frac{5(t - 3)(t + 3)}{t - 3} \cdot \frac{3t(t + 2)}{t + 2},\end{aligned}$$

og forkorter

$$\begin{aligned}\frac{5(t - 3)(t + 3)}{t - 3} \cdot \frac{3t(t + 2)}{t + 2} &= 5(t + 3)3t \\ &= 15t(t + 3) \\ &= 15t^2 + 45t.\end{aligned}$$

**Sensurveiledning:** 10% for å multiplisere med omvendt brøk, 60% for å faktorisere korrekt, 30% for å forkorte riktig.

c)

$$\ln x - \ln(x^2 - x) = 1 \quad x \in \langle 1, \rightarrow \rangle$$

$$\ln \frac{x}{x^2 - x} = 1$$

$$\frac{x}{x^2 - x} = e$$

$$x = e(x^2 - x)$$

$$ex^2 - ex - x = 0$$

$$x(ex - e - 1) = 0$$

$$ex - e - 1 = 0 \quad x = 0$$

$$ex = e + 1 \quad \emptyset$$

$$x = \frac{e + 1}{e}$$

$$L = \frac{e + 1}{e}$$

---

---

### Sensurveiledning:

Viser ikke at grunnmengden er  $x \in \langle 1, \rightarrow \rangle$  trekk 10%

Kommer fram til  $\frac{x}{x^2 - x} = e$  men klarer ikke isolere x trekk 50%

## Oppgave 2

a)  $(3x^3 - 4x^2 - 14x + 11):(x^2 - 3x + 2) = 3x + 5 + \frac{-5x+1}{x^2-3x+2}$

**Sensurveiledning:** Trekk 50% hvis restleddet ikke er med i svaret.

- b) Vi bruker setninga som sier at resten ved  $P(x)$ :  $(x - x_0)$  kan regnes direkte som  $r = P(x_0)$ . Her er  $x_0 = -3$ , og dermed

$$r = (-3)^3 - 13(-3) - 12 = -27 + 39 - 12 = 0.$$

Siden resten ved polynomdivisjonen er 0 er  $x + 3$  en faktor i polynomet.

- c) Først trekker vi fra 12 på hver side og får  $x^3 - 13x - 12 > 0$ . Vi må faktorisere tredjegradsuttrykket, og bruker fra b) at  $x + 3$  er en faktor. Polynomdivisjon gir

$$(x^3 - 13x - 12):(x + 3) = x^2 - 3x - 4.$$


Vi bruker andregradsformelen til å finne nullpunkt til  $x^2 - 3x - 4$ ,

$$x_{\pm} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} = \left\{ \begin{array}{l} -1 \\ 4 \end{array} \right\},$$

og vi får  $x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$ . Dermed

$$x^2 - 3x - 4 = (x + 3)(x + 1)(x - 4),$$

med fortegnslinje



Vi leser av fortegnslinja  $-3 < x < -1$  eller  $4 < x$ .

**Sensurveiledning:** 40% for å faktorisere tredjegradsuttrykket. 40% for fortegnslinje. 20% for å lese av svaret riktig.

### Oppgave 3

a)

$$g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

$$u = \ln x \quad u' = \frac{1}{x}$$

$$v = x^2 \quad v' = 2x$$

$$g'(x) = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln x \cdot 2x}{(x^2)^2} = \frac{x - 2x\ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^4} = \underline{\underline{\frac{1 - 2\ln x}{x^3}}}$$

Sensurveiledning:

Deriverer teller eller nevner feil trekk 20%. Forkorter ikke svaret med x trekk 10%

b)

$$f(x) = x(x + 3)^3$$

$$u = x \quad u' = 1$$

$$v = (x + 3)^3 \quad v' = 3(x + 3)^2$$

$$f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v' = 1 \cdot (x + 3)^3 + x \cdot 3(x + 3)^2 = (x + 3)^2(x + 3 + 3x) =$$

$$\underline{\underline{(x + 3)^2(4x + 3)}}$$

Sensurveiledning:

Deriverer faktoren  $(x + 3)^3$  feil trekk 30%. Forenkler ikke svaret trekk 10%

c)

$$\frac{1}{2x}y' = e^{-y}$$

$$\frac{1}{2x}\frac{dy}{dx} = e^{-y}$$

$$\frac{dy}{e^{-y}} = 2x dx$$

$$e^y \cdot dy = 2x \cdot dx$$

$$\int e^y \cdot dy = \int 2x \cdot dx$$

$$e^y = x^2 + C$$

$$\ln e^y = \ln(x^2 + C)$$

$$y = \ln(x^2 + C)$$


$$y = 1 \quad \text{når } x = 0$$

$$1 = \ln(0 + C) \rightarrow \ln C = 1 \rightarrow C = e$$

$$\underline{\underline{y = \ln(x^2 + e)}}$$

### Sensurveiledning:

Klarer ikke å finne konstanten C trekk 20%. Klarer å separere, integrerer feil trekk 80%

**Oppgave 4**

$$1^2 + a^2 = 3^2$$

$$a = \sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\cos x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$


$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot -\frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$\tan x = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

**Sensurveiledning:**

Hvert delsvar teller 33%.

### Oppgave 5



$$\cos 30^\circ = \frac{AB}{AC}$$

$$AC = \frac{AB}{\cos 30^\circ} = \frac{3}{\cos 30^\circ} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = \underline{\underline{2\sqrt{3}}}$$

**Sensurveiledning:**

Kalkulator på radianer trekk 20%

b)

$$\angle D = 180^\circ - 40^\circ - 80^\circ = 60^\circ$$

$$\frac{AD}{\sin 80^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$$

$$AD = \frac{2\sqrt{3} \cdot \sin 80^\circ}{\sin 60^\circ} = \underline{\underline{3.94}}$$

c)

$$A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3.94 \cdot \sin 40^\circ = \underline{\underline{6.98}}$$

## Oppgave 6

- a) Vi ser av de vertikale hjelpe linjene at funksjonen har vertikale asymptoter  $x = -1$  og  $x = 3$ . Den skrå hjelpe linjen angir en skrå asymptote. Vi ser at linja går gjennom blant annet punktene  $(0,3)$  og  $(4,5)$ . Det gir stigningstall  $a = \frac{5-3}{4-0} = \frac{1}{2}$ , og fra ettpunktsformelen får vi

$$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 0),$$

som kan skrives

$$y = \frac{1}{2}x + 3.$$

**Sensurveiledning:** 30% for hver av de verikale asymptotene. 40% for skrå asymptote. Trekk 20% for horisontal asymptote. Trekk 20% om vertikal asymptote omtales som horisontal, eller motsatt.

- b) Grafen stiger fram til  $x \approx 1,8$ , og synker til  $x \approx 4,3$ , for så stige for resten av tallinja.. Legg merke til at de deriverte ikke er definert for  $x = -1$  eller  $x = 3$ . Videre ser vi at grafen krummer oppover for  $x < -1$  og  $x > 3$ , og krummer nedover for  $-1 < x < 3$ .

**Sensurveiledning:** 50% for hver av de to fortegnslinjene.

- c) Vi ser at det er ett toppunkt i cirka  $(1,8, 2,9)$  og ett bunnpunkt i cirka  $(4,3, 5,8)$ .  
Det er ingen vendepunkt.

**Sensurveiledning:** Vær raus med feilmarginer på koordinatene. 40% for hvert av topp/bunn. 20% for ingen vendepunkt. Trekk 20% for koordinater til vendepunkt (altså max score er 60% om et eller flere vendepunkt er angitt).

## Oppgave 7

- a)  $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = [4,1,-1] + [(-2)-2,2-3,1-0] = [4+(-4),1+(-1),(-1)+1] = [0,0,0] = \vec{0}$   
 $\Rightarrow D(0,0,0). D$  ligger i origo.

**Sensurveiledning:** Metoden teller 70%. Trekk inntil 30% på feil i utregningen.

b)  $A_p = |\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DC}|$   
 $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{OA} = [4,1,-1]$   
 $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OC} = [-2,2,1]$   
 $\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DC} = [1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2, (-1) \cdot (-2) - 4 \cdot 1, 4 \cdot 2 - 1 \cdot (-2)] = [3, -2, 10]$

$$A_p = |[3, -2, 10]| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 10^2} = \sqrt{113} \approx 10,63$$

**Sensurveiledning:** Metoden teller 70%. Trekk inntil 30% på feil i utregningen.

c)  $V_{Pyramide} = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h \Leftrightarrow h = \frac{3 \cdot V_{Pyramide}}{G}$

$$G = A_p = \sqrt{113}$$

$$\begin{aligned} V_{Pyramide} &= \frac{1}{3} \cdot (\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DC}) \cdot \overrightarrow{DT} = \frac{1}{3} \cdot [3, -2, 10] \cdot [1, 1, 4] \\ &= \frac{1}{3} \cdot (3 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 10 \cdot 4) = \frac{41}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow h = \frac{3 \cdot \frac{41}{3}}{\sqrt{113}} = \frac{41}{\sqrt{113}} \approx 3,86$$

**Sensurveiledning:** Metoden teller 70%. Trekk inntil 30% på feil i utregningen.

- d) Vi trenger et punkt,  $P_0$ , i og en normalvektor,  $\vec{n}$ , til planet. Siden  $ABCD$  er et parallellogram må også  $D$  ligge i planet. Da er det lettest å velge  $D$ , som er origo, som  $P_0$ . Kryssproduktet,  $\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DC}$ , er et naturlig valg for normalvektoren.  
 $\Rightarrow$  Planet gjennom  $A, B$  og  $C$  kan uttrykkes

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$3(x - 0) + (-2)(y - 0) + 10(z - 0) = 0$$

$$3x - 2y + 10z = 0$$

**Sensurveiledning:** 50% trekk for feil retning på normalvektoren/benytte punkt som ikke ligger i planet. Trekk 10% på ikke å forkorte likningen mest mulig, om dette skulle være aktuelt.

$$\begin{aligned}
 e) \quad & \angle BDT = \cos^{-1} \left( \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DT}}{|\overrightarrow{DB}| \cdot |\overrightarrow{DT}|} \right) \\
 & \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{OB} = [2, 3, 0] \\
 & \overrightarrow{DT} = \overrightarrow{OT} = [1, 1, 4] \\
 & \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DT} = [2, 3, 0] \cdot [1, 1, 4] = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 = 5 \\
 & |\overrightarrow{DB}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{13} \\
 & |\overrightarrow{DT}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{18} \\
 \Rightarrow & \angle BDT = \cos^{-1} \left( \frac{5}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{18}} \right) \approx 70,92^\circ
 \end{aligned}$$

**Sensurveiledning:** Metoden teller 70%. Trekk inntil 30% på feil i utregningen. Trekk 20% om vinkelen ender med å bli  $\approx 109,08^\circ$

### Oppgave 8

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x \\
 & 2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x \\
 & \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)
 \end{aligned}$$

q.e.d.

**Sensurveiledning:** Trekk inntil 100% for å late som om man kommer frem.

b) Benytt formelen i a) til å bestemme Amplituden, likevektslinjen og perioden til

$$f(x) = \sin^2 x.$$

$$f(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$$

Gir


$$\text{Amplitude, } A = \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\text{Likevektslinje, } d = \frac{1}{2}$$

$$\text{Svingetall, } k = 2 \Rightarrow \text{Perioden } p = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

**Sensurveiledning:** Trekk 40% for første feil. 30% på hver av de to neste feilene.

c)  $f(x) = \sin^2 x, x \in [0, 2\pi]$ :



**Sensurveiledning:** Vær raus i bedømmingen her. Trekk inntil 30% på detaljene.

d) Avlest fra grafen til  $f(x) = \sin^2 x: V_f = [0, 1]$

**Sensurveiledning:** Feil klammer trekkes 30%.

e)  $\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)dx = \int \frac{1}{2}dx - \int \frac{1}{2}\cos 2x \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sin 2x + C = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$

**Sensurveiledning:** Integrasjon av bare det første leddet ( $\int \frac{1}{2}dx$ ), belønnes med 10%.

Å utelukke faktoren  $\frac{1}{a}$  når det integreres med lineær kjerne, trekkes 40%. Feil fortegn på antideriverte av cosinus trekkes 10%. Å glemme C trekkes 10 %.

f)  $\int \sin^2 x \, dx = \sin x \cdot (-\cos x) - \int \cos x \cdot (-\cos x)dx = -\sin x \cos x + \int \cos^2 x \, dx = -\sin x \cos x + \int (1 - \sin^2 x)dx = -\sin x \cos x + x - \int \sin^2 x \, dx$   
 $\Rightarrow 2\int \sin^2 x \, dx = x - \sin x \cos x + C'$   
 $\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sin x \cos x + C$

e) og f) blir det samme da  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

**Sensurveiledning:** Feil fortegn på antideriverte av sinus trekkes 10%. Å glemme C trekkes ikke hvis dette allerede er trukket i oppgave e). Ingen forklaring på forskjellen i resultat trekkes 30%